

متطلبات التطعيم في مدارس ولاية ميزوري للعام الدراسي 2021-2020

- يجب على جميع الطلاب تقديم وثائق تطعيم محدثة تتضمن الشهر واليوم والعام لكل تطعيم قبل الالتحاق في المدرسة.
- تتيح اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP) فترة سماح قدرها 4 أيام. يمكن للطلاب من جميع الصفوف أن يتلقوا التطعيمات حتى أربعة أيام قبل تاريخ الاستحقاق.
- ينبغي إعطاء التطعيمات المطلوبة وفقاً للجدول الحالي للجنة الاستشارية لممارسات التطعيم، بما في ذلك جميع الفترات الفاصلة، <http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>.
- لمواصلة الدوام في المدرسة، يجب أن يكون لدى الطلاب، الذين هم "قيد تلقي التطعيمات"، نموذج "جار تلقي التطعيمات" (Imm.P.14) في ملفاتهم. ويُقصد بقيد تلقي التطعيمات، أن الطفل قد بدأ سلسلة اللقاحات وتم تحديد موعد له لتلقي الجرعة التالية. يجب الالتزام بهذا الموعد وتقديم سجل محدث إلى المدرسة. إذا لم يتم الالتزام بالموعد، فلن يُعد الطفل "قيد تلقي التطعيمات" وسُيُعد غير ممتثل (أي، بدأت سلسلة لقاح التهاب الكبد الفيروسي نوع ب ولكن الطفل غير مؤهل بعد لتلقي الجرعة التالية في السلسلة).
- يُسمح بالاستثناءات الدينية (Imm.P.11A) والطبية (Imm.P.12). يجب وضع بطاقة الاستثناء الملائمة في الملف. يكون الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيمات عرضة للاستبعاد من المدرسة في حالة انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات.

الجرعة المطلوبة لكل صف													اللقاحات المطلوبة للالتحاق في المدرسة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	الروضة		
+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	اللقاح الثلاثي البكتيري (DTaP)/ لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP)/ لقاح الدفتيريا والتيتانوس (DT) ¹
1	1	1	1	1										لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap) ²
2	1	1	1	1										لقاح MCV ³ (المكورات السحائية المتقارن)
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	لقاح شلل الأطفال غير المنشط (IPV (Polio)) ⁴
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ⁵
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	التهاب الكبد الفيروسي نوع ب ⁶
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	لقاح الحمق ⁷

1. آخر جرعة بحلول عيد الميلاد الرابع أو بعده وأخر جرعة من لقاح السعال الديكي للأطفال قبل عيد الميلاد السابع. الحد الأقصى للجرعات اللازمة: ست جرعات.
2. الصفوف 8-12: مطلوب لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap)، الذي يحتوي على لقاح السعال الديكي.
3. الصفوف 8-11: مطلوب جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية المتقارن (MCV). يجب إعطاء الجرعة بعد بلوغ 10 أعوام من العمر.
4. الصف 12: مطلوب جرعتان من MCV ما لم تكن الجرعة الأولى قد تم إعطاؤها للطلاب في عمر 16 عامًا أو أكبر، في تلك الحالة، يلزم جرعة واحدة فقط. يجب إعطاء جرعة واحدة على الأقل بعد بلوغ 16 عامًا من العمر.
4. صفوف الروضة-10: يجب إعطاء آخر جرعة بحلول عيد الميلاد الرابع أو بعده. ينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بين الجرعة قبل الأخيرة والآخرى ستة أشهر على الأقل.
5. الصفوف 11-12: الجرعة الأخيرة بحلول عيد الميلاد الرابع أو بعده. أي مزيج من أربع جرعات من لقاح شلل الأطفال الذي يعطى عن طريق الحقن (IPV) ولقاح شلل الأطفال الذي يعطى عن طريق الفم (OPV) يحتوي على السلسلة كاملة. الحد الأقصى من الجرعات اللازمة: أربع جرعات.
5. يجب إعطاء الجرعة الأولى ببلوغ إثني عشرة شهرًا من العمر أو بعد ذلك.
6. يجب أن تكون هناك فترة فاصلة تبلغ أربعة أسابيع على الأقل بين الجرعة الأولى والثانية؛ و 8 أسابيع على الأقل بين الجرعة الثانية والثالثة؛ و 16 أسبوعًا على الأقل بين الجرعة الأولى والثالثة ويجب ألا يتم إعطاء الجرعة الأخيرة قبل بلوغ 24 أسبوعًا على الأقل من العمر.
7. يجب إعطاء الجرعة الأولى ببلوغ إثني عشرة شهرًا من العمر أو بعد ذلك. صفوف الروضة-10: كدليل كافٍ على الإصابة بالمرض، يمكن أن يقوم مقدم الرعاية الصحية المرخص بتوقيع بيان مكتوب يوثق فيه شهر وعام الإصابة السابقة بمرض الحمق (جدري الماء) ويضعه في الملف الموجود لدى المدرسة. الصفوف 11-12: كدليل كافٍ على الإصابة بالمرض، يمكن أن يقوم ولي الأمر/ الوصي أو الطبيب بتوقيع بيان مكتوب يوثق فيه شهر وعام الإصابة السابقة بمرض الحمق (جدري الماء) ويضعه في الملف الموجود لدى المدرسة.