

# 2021-2022 በሚከተረ ትምህርት ቤት የክትባት መስፈርቶች

- ሁሉም ተማሪዎች ት/ቤት ከመግባታቸው በፊት የእያንዳንዱን ክትባት ወር፣ ቀን እና ዓመት ጨምሮ ወቅታዊ የክትባት ሁኔታ ሰነድ ማቅረብ አለባቸው።
- የክትባት ልምዶች አማካሪ ኮሚቴ (ACIP) የ 4 ቀን የመከተብያ ጊዜን ይሰጣል። በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከቀን በፊት እስከ አራት ቀን ድረስ ክትባት መውደድ አለባቸው።
- ሁሉንም የክትባት ልምዶች ጨምሮ በአሁኑ የክትባት ልምዶች መርሃግጥር አማካሪ ኮሚቴ መሠረት አስፈላጊ ክትባቶች መሰጠት አለባቸው፣ (<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>).
- በትምህርት ቤት ውስጥ ለመቆየት፣ “በሂደት ላይ ያሉ” ተማሪዎች በፋይል ላይ የክትባት ሂደት ቅጽ (Imm.P.14) ሊኖራቸው ይገባል። በሂደት ላይ ማለት አንድ ልጅ የክትባቱን ተከታታይ ጀምሯል እናም ለሚቀጥለው ቀጠሮ ይዛል ማለት ነው። ይህ ቀጠሮ ተጠብቆ ለት/ቤቱ የዘመነ መዝገብ መሰጠት አለበት። ቀጠሮው ካልተከበረ ልጁ ከእንግዲህ በት/ቤት ገበታ በሂደት ላይ አይገኝም እና ግዳጁን አልተወጣም ማለት ነው። (ማለትም፣ የሂፕ ቢ ክትባት ተከታታይ ተጀምሯል ነገር ግን ልጁ በተከታታይ ውስጥ የሚቀጥለውን መጠን ለመቀበል ገና ብቁ አይደለም)
- የሃይማኖታዊ (Imm.P.11A) እና የህክምና (Imm.P.12) በመመርኮዝ ክትባት ካለመወጋት ነፃ ይሆናሉ። አግባብ ያለው ነፃ ካርድ በፋይል ላይ መሆን አለበት። በክትባት ሊከላከሉ የሚችሉ በሽታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ ክትባቱን ያልተቀበሉ ሕፃናት ከትምህርት ቤት እንዲገለጹ ይደረጋል።

ለት/ቤት መገኘት የሚያስፈልጉ ክትባቶች	በክፍል ደረጃ የሚፈለግ መጠን												
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DTaP/DTP/DT <sup>1</sup> (ዲቲኤፕ/ዲቲፕ/ዲቲ1)	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
Tdap <sup>2</sup> (ቲዲፕ2)									1	1	1	1	1
MCV <sup>3</sup> (ሙሲቤ3) (Meningococcal Conjugate) (አንገት ቆልፍ)									1	1	1	1	2
IPV (Polio) <sup>4</sup> (ኢፕቪ4)	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
MMR <sup>5</sup> (ሙሙሮ3)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hepatitis B <sup>6</sup> (ሂፕታይቲስ ቢ5)	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
Varicella <sup>7</sup> (ቫሪሴላ7)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

1. የመጨረሻው መጠን በአራተኛው የልደት ቀን ወይም በኋላ እና የመጨረሻው የሰባተኛው የልደት ቀን በፊት የሕፃናት ትክክል መጠን።  
**ከፍተኛ የሚያስፈልገው** መጠን፤ ስድስት
2. 8-12 ክፍሎች Tdap (ቲዲፕ)፤ የትክክል ክትባት ይይዛል። አስፈላጊ ነው።
3. ክፍል 8-11: አንድ የ MCV መጠን ያስፈልጋል ። መጠን ከ 10 ዓመት በኋላ መሰጠት አለበት።  
ክፍል 12: የመጀመሪያው መጠን ዕድሜው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ለሆነ ተማሪ ካልተሰጠ በቀር ሁለት መጠን MCV ያስፈልጋል፣ በዚህ ጊዜ አንድ መጠን ብቻ ያስፈልጋል። ከ 16 ዓመት በኋላ ቢያንስ አንድ መጠን መሰጠት አለበት።
4. መዋለ ሕፃናት -11: ክፍል፤ የመጨረሻው መጠን በአራተኛው የልደት ቀን ወይም ከዚያ በኋላ መሰጠት አለበት። በሚቀጥለው እና በመጨረሻው መጠን መካከል ያለው ልዩነት ቢያንስ ስድስት ወር መሆን አለበት።  
ክፍል 12: የመጨረሻው መጠን በአራተኛው የልደት ቀን ወይም በኋላ። ማንኛውም የአራት መጠን IPV እና OPV ውህደት የተሟላ ተከታታይ ነው። **ከፍተኛ የሚያስፈልገው** መጠን፤ አራት.
5. የመጀመሪያ መጠን መሰጠት ያለበት በአሥራ ሁለት ወር ዕድሜ ላይ ወይም በኋላ ነው።
6. ከአንድ እስከ ሁለት ባለው መጠን መካከል ቢያንስ አራት ሳምንታት መሆን አለባቸው። በሁለት እና በሶስት መካከል ቢያንስ 8 ሳምንታት፤ ከአንድ እስከ ሶስት ባለው እና በመጨረሻው መጠን መካከል ቢያንስ 16 ሳምንታት ከ 24 ሳምንቶች ያልበለጠ መሰጠት አለባቸው።
7. የመጀመሪያ መጠን መሰጠት ያለበት በአሥራ ሁለት ወር ዕድሜ ላይ ወይም በኋላ ነው።  
መዋለ ሕፃናት -11: ክፍል፤ እንደ አጥጋቢ የበሽታ ማስረጃ፣ ፈቃድ ያለው የጤና አጠባበቅ አቅራቢ የቀደመውን የ varicella (chickenpox) በሽታ ወር እና ዓመት የሚያመለክት የጽሑፍ መግለጫ ከት/ቤቱ ጋር ይፈረማል።  
ክፍሎች 12: እንደ አጥጋቢ የበሽታ ማስረጃ፣ አንድ ወላጅ/አሳዳጊ ወይም MD ወይም DO የቀደመውን የ varicella (chickenpox) በሽታ ወር እና ዓመትን የሚገልጽ የጽሑፍ መግለጫ በትምህርት ቤቱ ላይ ፈረመው ማስቀመጥ ይችላሉ።