

متطلبات التطعيم في مراكز رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة بولاية ميزوري لعام 2021

- يجب على جميع الأطفال تقديم وثائق بشأن حالة التطعيم المحدثة، بما في ذلك الشهر واليوم والعام لكل تطعيم قبل الالتحاق في مراكز رعاية الأطفال/ مرحلة ما قبل المدرسة.
- تتيح اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم فترة سماح قدرها 4 أيام. يمكن أن يتلقى الأطفال التطعيمات حتى أربعة أيام قبل تاريخ الاستحقاق.
- ينبغي إعطاء التطعيمات وفقاً للجدول الحالي الخاص باللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم، بما في ذلك جميع الفترات الفاصلة، (<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>).
- يُسمح باستثناءات ولي الأمر/ الوصي (Imm.P.11) والاستثناءات الطبية (Imm.P.12). يجب وضع بطاقة الاستثناء الملائمة في الملف. يكون الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيمات عرضة للاستبعاد من مراكز رعاية الأطفال/ مرحلة ما قبل المدرسة في حالات انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات.
- لمواصلة الدوام في مراكز رعاية الأطفال/ مرحلة ما قبل المدرسة، يجب أن يكون لدى الطلاب، الذين هم "قيد تلقي التطعيمات"، نموذج "جار تلقي التطعيمات" (Imm.P.14) في ملفاتهم. ويُقصد بقيد تلقي التطعيمات، أن الطفل قد بدأ سلسلة اللقاحات وتم تحديد موعد له ليتلقى الجرعة التالية. يجب الالتزام بهذا الموعد وتقديم سجل محدث إلى المنشأة. إذا لم يتم الالتزام بالموعد، فلن يُعد الطفل "قيد تلقي التطعيمات" وسيُعد غير ممتثل (أي، بدأت سلسلة لقاح التهاب الكبد الفيروسي نوع ب ولكن الطفل غير مؤهل بعد لتلقي الجرعة التالية في السلسلة).

الجرعة المطلوبة وفقاً للعمر																			اللقاحات المطلوبة للالتحاق في مراكز رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة	
عقب الولادة	1 شهر	2 أشهر	3 أشهر	4 أشهر	5 أشهر	6 أشهر	7 أشهر	8 أشهر	9 أشهر	10 أشهر	11 أشهر	12 أشهر	13 أشهر	14 أشهر	15 أشهر	16 أشهر	17 أشهر	18 أشهر		19 شهراً وحتى دخول الروضة
																				اللقاح الثلاثي البكتيري (DTaP)/ لقاح الدفتيريا والتيتانوس (DT)
																				لقاح شلل الأطفال غير المنشط (IPV (Polio))
																				لقاح المستدمية النزلية (Hib)
																				التهاب الكبد الفيروسي نوع ب
																				لقاح PCV (المكورات الرئوية المتقارن)
																				لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)
																				لقاح الحمق

(+): إذا تم تطعيم طفل وفقاً لتوصيات اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP)، فقد يتلقى الطفل جرعات أكثر من الجرعات المطلوبة لدى مراكز رعاية الأطفال).

