

## متطلبات التطعيم في مدارس ولاية ميزوري للعام الدراسي 2022-2023

- يجب على جميع الطلاب تقديم وثائق تطعيم محدثة تتضمن الشهر واليوم والعام لكل تطعيم قبل الالتحاق بالمدرسة.
- تتيح اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP) فترة إمهال قدرها 4 أيام. يمكن للطلاب من جميع الصفوف أن يتلقوا التطعيمات حتى أربعة أيام قبل تاريخ الاستحقاق.
- ينبغي إعطاء التطعيمات اللازمة وفقاً للجدول الحالي الخاص باللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم، بما في ذلك جميع الفترات الفاصلة، (<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>).
- لمواصلة الدوام في المدرسة، يجب أن يكون لدى الطلاب، الذين هم "قيد تلقي التطعيمات"، نموذج "جار تلقي التطعيمات" (Imm.P.14) في ملفاتهم. ويُقصد بقيد تلقي التطعيمات، أن الطفل قد بدأ سلسلة اللقاحات وتم تحديد موعد له ليتلقى الجرعة التالية. يجب الالتزام بهذا الموعد وتقديم سجل محدث إلى المدرسة. إذا لم يتم الالتزام بالموعد، فلن يُعد الطفل "قيد تلقي التطعيمات" وسُعيد غير ممتثل (أي، بدأت سلسلة لقاح التهاب الكبد الفيروسي نوع ب ولكن الطفل غير مؤهل بعد لتلقي الجرعة التالية في السلسلة).
- يُسمح بالاستثناءات الدينية (Imm.P.11A) والطبية (Imm.P.12). يجب أن تكون بطاقة الإعفاء المناسبة مدرجة في الملف. يكون الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيمات عرضة للاستبعاد من المدرسة في حالة انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات.

الجرعة المطلوبة لكل صف												اللقاحات المطلوبة للالتحاق في المدرسة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		الروضة
+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	اللقاح الثلاثي البكتيري (DTaP)/لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP)/لقاح الدفتيريا والكزاز (DT).
1	1	1	1	1									لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap <sup>2</sup> )
2	1	1	1	1									لقاح المكورات السحائية المتقارن (MCV <sup>3</sup> ) (المكورات السحائية المتقارن)
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	لقاح شلل الأطفال غير المنشط (IPV (Polio) <sup>4</sup> )
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR <sup>5</sup> )
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	التهاب الكبد الفيروسي ب 6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	لقاح الحمق 7

1. آخر جرعة بحلول عيد الميلاد الرابع أو بعده وأخر جرعة من لقاح السعال الديكي للأطفال قبل عيد الميلاد السابع. الحد الأقصى للجرعات اللازمة: ست جرعات.
  2. الصفوف 8-12: مطلوب لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap)، الذي يحتوي على لقاح السعال الديكي.
  3. الصفوف 8-11: مطلوب جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية المتقارن (MCV). يجب إعطاء الجرعة بعد بلوغ 10 أعوام من العمر.
  4. الصف 12: مطلوب جرعتان من MCV ما لم تكن الجرعة الأولى قد تم إعطاؤها للطلاب في عمر 16 عامًا أو أكبر، في تلك الحالة، يلزم جرعة واحدة فقط. يجب إعطاء جرعة واحدة على الأقل بعد بلوغ 16 عامًا من العمر.
  4. من الروضة إلى الصف الثاني عشر: يجب إعطاء آخر جرعة بحلول عيد الميلاد الرابع أو بعده. ينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بين الجرعة قبل الأخيرة والأخيرة ستة أشهر على الأقل.
  5. يجب إعطاء الجرعة الأولى ببلوغ اثني عشرة شهرًا من العمر أو بعد ذلك.
  6. يجب أن تكون هناك فترة لا تقل عن أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية ولا تقل عن 8 أسابيع بين الجرعة الثانية والثالثة ولا تقل عن 16 أسبوعًا بين الجرعة الأولى والثالثة ويجب عدم إعطاء الجرعة النهائية قبل بلوغ 24 أسبوعًا من العمر.
  7. يجب إعطاء الجرعة الأولى ببلوغ اثني عشرة شهرًا من العمر أو بعد ذلك.
- من الروضة إلى الصف الثاني عشر: كدليل كافٍ على الإصابة بالمرض، يمكن أن يقوم مقدم الرعاية الصحية المرخص بتوقيع بيان مكتوب يوثق فيه شهر و عام الإصابة السابقة بمرض الحمق (جدري الماء) ويضعه في الملف الموجود لدى المدرسة.

